



IDENTIFICACIÓN

Bee 6° es una tecnología de biofermentación diseñada para favorecer la actividad de las abejas durante la floración. Su formulación incorpora un consorcio seleccionado de bacterias lácticas que, mediante una fermentación controlada, generan un perfil natural de compuestos volátiles y señales aromáticas con capacidad de estimular la respuesta de los polinizadores hacia las flores. Estos compuestos volátiles son señales que las abejas reconocen para localizar flores y aumentar su actividad como agente polinizante.

Bee 6° complementa la acción de las colmenas, optimizando la orientación y actividad de las abejas durante el período crítico de floración.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Componente	Contenido
Nitrógeno (N)	0,07% p/v
Fósforo expresado como (P ₂ O ₅)	<0,04% p/v
Potasio expresado como (K ₂ O)	0,02% p/v

PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS

pH (10%) a 20°C: 4,0
Densidad a 20 °C: 1.006 g/L
Solubilidad a 20 °C: 100%

METALES PESADOS

Elemento	Contenido
Arsénico (As)	< 0,2 mg/kg
Cadmio (Cd)	0,3 mg/kg
Mercurio (Hg)	< 0,5 mg/kg
Níquel (Ni)	< 0,001 mg/kg
Plomo (Pb)	< 0,5 mg/kg
Cromo hexavalente (Cr (VI))	< 0,001 mg/kg

Fabricado y distribuido por
Fitotecnología FTGL SpA.

Parcela 67 Lt. 1 pp San Dionisio,
Comuna Colbún

+ 569 3344 8944

contacto@fitological.com

V_122026

AGÍTESE ANTES DE USAR.

NOTA AL COMPRADOR: Fitotecnología FTGL SpA garantiza la calidad del producto y la composición declarada. Los resultados de uso pueden variar por factores de aplicación, cultivo, condiciones ambientales, manejo y almacenamiento, los cuales son responsabilidad del usuario.

CONTENIDO NETO: 20 L

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Momento de aplicación	Dosis L/ha
BERRIES (Arándano, frutilla, frambueso)	Realizar la aplicación con un mínimo de 5 % de floración	7-10
CAROSOS (Duraznero, ciruelo, cerezo, nectarino)		
POMÁCEAS (Manzano, peral)		
VIDES (Vid de mesa, vid vinífera)		
OTROS (Nogal, kiwi, almendro, cítricos, palto, avellano europeo)		
OLEAGINOSAS (Raps, maravilla)		5-10
CUCURBITÁCEAS SEMILLEROS		

(*) En cultivos dioicos o de polinización cruzada, asegurar que el porcentaje mínimo de floración indicado corresponda a flores femeninas o a flores que darán origen a fruto.

Apto para aplicación aérea mediante drones agrícolas.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Incorporar al estanque de aplicación manteniendo agitación. Aplicar uniformemente según la dosis, cultivo y momento de aplicación definidos. En mezclas con otros productos, realizar previamente una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

RESTRICCIONES DE APLICACIÓN

Evite mezclar con bactericidas.

ALMACENAJE

Almacenar en su envase original, cerrado e identificado, en un lugar seco, fresco y ventilado, protegido de la radiación solar directa y de temperaturas extremas. Mantener fuera del alcance de niños, animales y personas inexpertas.

Tiempo de almacenaje: 12 meses

PRECAUCIONES GENERALES

Producto de uso agrícola. Evitar la ingestión y el contacto innecesario con ojos y piel. No comer, beber ni fumar durante su manipulación. Lavarse las manos después de usar. No contaminar cursos ni fuentes de agua. No reutilizar el envase vacío.

LEA COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO