



COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N)	0,07% p/v
Fósforo expresado como (P ₂ O ₅)	<0,04% p/v
Potasio expresado como (K ₂ O)	0,02% p/v

PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS

pH (10%) a 20°C:	4,0
Densidad a 20°C:	1.006 g/L
Solubilidad a 20 °C:	100%

BEE 6® es una tecnología de biofermentación diseñada para favorecer la actividad de las abejas durante la floración. Su formulación incorpora un consorcio seleccionado de bacterias lácticas que, mediante una fermentación controlada, generan un perfil natural de compuestos volátiles y señales aromáticas con capacidad de estimular la respuesta de los polinizadores hacia las flores. Estos compuestos volátiles son señales que las abejas reconocen para localizar flores y aumentar su actividad como agente polinizante.

BEE 6® complementa la acción de las colmenas, optimizando la orientación y actividad de las abejas durante el período crítico de floración.

INSTRUCCIONES DE USO

Agite el producto antes de usar. Mezclar con agua en dosis recomendadas de acuerdo al tipo de cultivo/frutal.

Apto para aplicación aérea mediante drones agrícolas.

RESTRICCIONES DE APLICACIÓN

Evite mezclar con bactericidas.

METALES PESADOS

Arsénico (As) < 0,2 mg/kg	Níquel (Ni) < 0,001 mg/kg
Cadmio (Cd) 0,3 mg/kg	Plomo (Pb) < 0,5 mg/kg
Mercurio (Hg) < 0,5 mg/kg	Cromo < 0,001 mg/kg hexavalente (Cr (VI))


ALMACENAMIENTO

Tiempo de almacenamiento: 12 meses. Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado.

AUMENTO EN N° DE VISITAS

El pepino es una especie de hábito rastrero cuya producción depende de una adecuada polinización de sus flores.

Promedio visitas de abejas por flor



Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos (Tukey, p < 0,05). BARRAS = + EE.

Cultivo	Momento de aplicación	Dosis L/ha
BERRIES (Arándano, frutilla, frambueso)	Realizar la aplicación con un mínimo de 5 % de floración	7-10
CAROSOS (Duraznero, ciruelo, cerezo, nectarino)		
POMÁCEAS (Manzano, peral)		
VIDES (Vid de mesa, vid vinífera)		
OTROS (Nogal, kiwi, almendro, cítricos, palto, avellano europeo)		
OLEAGINOSAS (Raps, maravilla)		5-10
CUCURBITÁCEAS SEMILLEROS		

(*) En cultivos dioicos o de polinización cruzada, asegurar que el porcentaje mínimo de floración indicado corresponda a flores femeninas o a flores que darán origen a fruto.

TRATAMIENTOS

T0	Testigo huerto
T1	5 L. Bee-6/ha
T2	10 L. Bee-6/ha

En las condiciones de esta validación, el promedio de visitas de abejas aumentó desde 1,9 visitas en el testigo hasta 8,7 y 11,2 visitas en los tratamientos BEE 6 a 5 y 10 L/Ha respectivamente.

PARA OBTENER ÓPTIMOS RESULTADOS, DOSIFICAR Y APLICAR SEGÚN INDICACIONES EN LA ETIQUETA

Fabricado por Fitotecnología Ftgl SpA.
Parcela 67 Lt. I PP San Dionisio, Comuna Colbún
☎+56 9 3344 8944 ✉contacto@fitological.com

WWW.FITOTECNOLOGIA.COM

