Lipo-Cover® (sl)

FERTILIZANTE FOLIAR

CONTENIDO NETO: 20 L

FITOTECNOLOGÍA
AGRICULTURA SUSTENTABLE

IDENTIFICACIÓN

Protector cuticular que forma una película flexible e hidrofóbica sobre los tejidos vegetales. Ayuda a disminuir la absorción rápida de agua, reducir el riesgo de partidura y mantener la firmeza del fruto.

Nutrición especializada: Ayuda a reducir partidura y mantener firmeza

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Componente	Contenido
Boro	0,8 % p/v
Calcio (expresado como CaO)	9,74% p/v

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS

pH al 10% a 20 °C: 7,4
Densidad a 20 °C: 1.207 g/L
Solubilidad a 20 °C: 100 %

METALES PESADOS

Arsénico (As)	<0,5 mg/kg
Cadmio (Cd)	<0,5 mg/kg
Mercurio (Hg)	<0,5 mg/kg
Plomo (Pb)	<0,5 mg/kg
Cromo hexavalente (Cr(VI))	<2,00 mg/kg
Níquel (Ni)	<12 mg/kg

V_012026

Fabricado y distribuido por Fitotecnología FTGL SpA.
Parcela 67 Lt. 1 pp San Dionisio, Comuna Colbún.
+56 9 3344 8944 · contacto@fitological.com

NOTA AL COMPRADOR: Fitotecnología garantiza calidad y composición declarada. Resultados sujetos a cultivo, ambiente, manejo y aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS	CONCENTRACIÓN
Cerezo, uva de mesa, manzano y arándano	Cuaja a cosecha.	2–3 L/ha	200 cc/100 L
Cerezo — riesgo de partidura	Previo a eventos de lluvia o condiciones con alto riesgo de partidura.	3–4 L/ha	400 cc/100 L

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Agitar antes de usar. Incorporar al estanque con agitación y aplicar según cultivo, dosis y momento.

ALMACENAJE

Mantener en envase original, cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado. Mantener fuera del alcance de niños y animales.

COMPATIBILIDAD

Realizar prueba previa de compatibilidad antes de mezclar.

PRECAUCIONES GENERALES

Evitar ingestión y contacto con ojos/piel. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavarse las manos después de usar. No contaminar cursos de agua ni reutilizar el envase.

AGÍTESE ANTES DE USAR.

LEA COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.