LIPO® FTGL Raquis

IDENTIFICACIÓN

Fertilizante foliar con acción protectora y antioxidante, formulado con tecnología liposomal y fosfolípidos vegetales. Contribuye a proteger los tejidos, reducir la deshidratación y mantener la integridad de membranas.

Nutrición especializada: Ayuda a reducir la deshidratación y mantener membranas

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Componente	Contenido
Zinc	2,16% p/v
Boro	0,26% p/v
Nitrógeno	1,66% p/v

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS

pH al 10% a 20 °C: 5,3
Densidad a 20 °C: 1.104 g/L
Solubilidad a 20 °C: 100 %

METALES PESADOS

Arsénico (As)	<0,2 mg/kg
Cadmio (Cd)	<0,1 mg/kg
Mercurio (Hg)	<0,5 mg/kg
Plomo (Pb)	<0,5 mg/kg
Cromo hexavalente (Cr(VI))	<2,00 mg/kg
Níquel (Ni)	<11 mg/kg

V_022026

Fabricado y distribuido por Fitotecnología FTGL SpA.
Parcela 67 Lt. 1 pp San Dionisio, Comuna Colbún.
+56 9 3344 8944 · contacto@fitological.com

NOTA AL COMPRADOR: Fitotecnología garantiza calidad y composición declarada. Resultados sujetos a cultivo, ambiente, manejo y aplicación.

CONTENIDO NETO: 20 L

FITOTECNOLOGÍA AGRICULTURA SUSTENTABLE

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS	CONCENTRACIÓN
BERRIES — Arándano	Desarrollo y maduración.	2–3 L/ha	200–300 cc/100 L
VIDES — Uva de mesa	Durante desarrollo y crecimiento de bayas.	Mínimo 3 L/ha	300 cc/100 L

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Agitar antes de usar. Incorporar al estanque con agitación y aplicar según cultivo, dosis y momento.

ALMACENAJE

Mantener en envase original, cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado. Mantener fuera del alcance de niños y animales.

COMPATIBILIDAD

Realizar prueba previa de compatibilidad antes de mezclar.

PRECAUCIONES GENERALES

Evitar ingestión y contacto con ojos/piel. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavarse las manos después de usar. No contaminar cursos de agua ni reutilizar el envase.

AGÍTESE ANTES DE USAR.

LEA COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.